

时间序列分析（初级）：作业 1 参考答案

2. 假设序列 $\{x_t\}$ 由 AR(1) 模型生成, $x_t = \phi x_{t-1} + \varepsilon_t$, 且 $|\phi| < 1$, $\varepsilon_t \sim (0, \sigma_\varepsilon^2)$, $\{\varepsilon_t\}$ 独立同分布.

(1) 推导 $\{x_t\}$ 的自协方差函数 $\gamma_x(k)$, $k \geq 0$ 的表达式.

(2) 令 $z_t = x_t - x_{t-1}$, 以 ϕ 和 σ_ε^2 表示 $\{z_t\}$ 的自协方差函数 $\gamma_z(k)$.

参考答案

(1) 由 $|\phi| < 1$, AR(1) 模型有传递形式

$$x_t = (1 - \phi B)^{-1} \varepsilon_t = \sum_{j=0}^{\infty} \phi^j \varepsilon_{t-j},$$

由 $\{\varepsilon_t\}$ 独立同分布, 对 $k \geq 0$ 有

$$\begin{aligned} \gamma_x(k) &= \text{Cov}(x_t, x_{t-k}) = \sum_{j=0}^{\infty} \phi^j \phi^{j+k} \sigma_\varepsilon^2 \\ &= \phi^k \sum_{j=0}^{\infty} \phi^{2j} \sigma_\varepsilon^2 = \phi^k \gamma_x(0), \end{aligned}$$

且

$$\gamma_x(0) = \text{Var}(x_t) = \frac{\sigma_\varepsilon^2}{1 - \phi^2},$$

所以

$$\gamma_x(k) = \frac{\phi^k}{1 - \phi^2} \sigma_\varepsilon^2, \quad k \geq 0.$$

(2) 由 $z_t = x_t - x_{t-1}$,

$$\begin{aligned} \gamma_z(k) &= \text{Cov}(z_t, z_{t-k}) \\ &= \text{Cov}(x_t - x_{t-1}, x_{t-k} - x_{t-k-1}) \\ &= \text{Cov}(x_t, x_{t-k}) + \text{Cov}(x_t, -x_{t-k-1}) \\ &\quad + \text{Cov}(-x_{t-1}, x_{t-k}) + \text{Cov}(-x_{t-1}, -x_{t-k-1}) \\ &= [\phi^k - \phi^{k+1} - \phi^{k-1} + \phi^k] \frac{\sigma_\varepsilon^2}{1 - \phi^2} \\ &= (2\phi - \phi^2 - 1) \phi^{k-1} \frac{\sigma_\varepsilon^2}{1 - \phi^2} \\ &= -\frac{(1 - \phi)^2}{1 - \phi^2} \phi^{k-1} \sigma_\varepsilon^2 \\ &= -\frac{1 - \phi}{1 + \phi} \phi^{k-1} \sigma_\varepsilon^2, \quad k \geq 1. \end{aligned}$$

当 $k = 0$ 时, $\gamma_z(0) = 2\gamma_x(0) - 2\gamma_x(1) = \frac{2\sigma_\varepsilon^2}{1 + \phi}$ (即方差, 供批改参考).

3. 假设 $x_t = \phi_1 x_{t-1} + \varepsilon_t$ 且 $\varepsilon_t \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} (0, \sigma^2)$. $x_0 = 0$, 样本观测为 $x_1, x_2, \dots, x_T$.

(1) 写出 ϕ_1 的 OLS 估计量 $\hat{\phi}_1$, 并推导当 $\phi_1 = 1$ 且 $T \rightarrow \infty$ 时, $T(\hat{\phi}_1 - 1)$ 的极限分布.

(2) 记 $\widehat{se}(\hat{\phi}_1)$ 为 $\hat{\phi}_1$ 的样本标准差, 给出当 $\phi_1 = 1$ 且 $T \rightarrow \infty$ 时, $\frac{\hat{\phi}_1 - 1}{\widehat{se}(\hat{\phi}_1)}$ 的极限分布. (提示:

示: 记 $S_T^2 = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \hat{\varepsilon}_t^2$, 其中 $\hat{\varepsilon}_t = x_t - \hat{\phi}_1 x_{t-1}$. 当 $T \rightarrow \infty$ 时, $S_T^2 \xrightarrow{P} \sigma^2$. 此外, $\widehat{se}(\hat{\phi}_1) = \sqrt{S_T^2 / \sum_{t=1}^T x_{t-1}^2}$).

参考答案

本题两问的完整推导即课堂关于 Dickey-Fuller 单位根检验的推导, 已原文附于本作业附录 (“课堂上的主要推导”): 包括附录 §1 (阶梯函数和泛函型中心极限定理)、§2.3 (Riemann sum 3, 式 (†)) 以及 §2.4 (在 H_0 下的 Dickey-Fuller 统计量, 式 (‡)). 此处仅给出要点与最终结论.

(1) ϕ_1 的 OLS 估计量为

$$\hat{\phi}_1 = \frac{\sum_{t=1}^T x_{t-1} x_t}{\sum_{t=1}^T x_{t-1}^2}.$$

在 $H_0: \phi_1 = 1$ 且 $x_0 = 0$ 下, $x_t = \varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \cdots + \varepsilon_t$, 且

$$\hat{\phi}_1 - 1 = \frac{\sum_{t=1}^T x_{t-1} \varepsilon_t}{\sum_{t=1}^T x_{t-1}^2}.$$

于是

$$T(\hat{\phi}_1 - 1) = \frac{(1/T) \sum_{t=1}^T x_{t-1} \varepsilon_t}{(1/T^2) \sum_{t=1}^T x_{t-1}^2},$$

分子分母分别由附录式 (‡) 和式 (†) 给出, 即

$$\frac{1}{T} \sum_{t=1}^T x_{t-1} \varepsilon_t \xrightarrow{d} \frac{\sigma^2}{2} \{[W(1)]^2 - 1\}, \quad \frac{1}{T^2} \sum_{t=1}^T x_{t-1}^2 \xrightarrow{d} \sigma^2 \int_0^1 [W(r)]^2 dr,$$

所以

$$T(\hat{\phi}_1 - 1) \xrightarrow{d} \frac{\frac{1}{2} \{[W(1)]^2 - 1\}}{\int_0^1 [W(r)]^2 dr} = \frac{\int_0^1 W(r) dW(r)}{\int_0^1 [W(r)]^2 dr},$$

其中 $W(r)$ 为标准布朗运动. 该极限分布即 Dickey-Fuller 分布, 是非标准的 (非正态) 分布, 其分位数由模拟给出.

(2) 由提示, $\widehat{se}(\hat{\phi}_1) = \sqrt{S_T^2 / \sum_{t=1}^T x_{t-1}^2}$, 且 $S_T^2 \xrightarrow{P} \sigma^2$ (记 $S_T = \sqrt{S_T^2}$, 则 $S_T \xrightarrow{P} \sigma$), 于是

$$\begin{aligned} \frac{\hat{\phi}_1 - 1}{\widehat{se}(\hat{\phi}_1)} &= (\hat{\phi}_1 - 1) \frac{\left(\sum_{t=1}^T x_{t-1}^2\right)^{1/2}}{S_T} \\ &= T(\hat{\phi}_1 - 1) \cdot \frac{1}{S_T} \left(\frac{1}{T^2} \sum_{t=1}^T x_{t-1}^2\right)^{1/2}, \end{aligned}$$

由 Slutsky 定理、 $S_T \xrightarrow{P} \sigma$ 以及附录中式 (†) 与 (‡) 的联合收敛, σ 被约去,

$$\frac{\hat{\phi}_1 - 1}{\widehat{se}(\hat{\phi}_1)} \xrightarrow{d} \frac{\frac{1}{2} \{[W(1)]^2 - 1\}}{\left\{\int_0^1 [W(r)]^2 dr\right\}^{1/2}},$$

即 Dickey-Fuller t 统计量的 (非标准) 极限分布.